

Мужское здоровье – совокупность физического, психического, социального благополучия мужчины, обеспечивающее его полноценное и комфортное существование.

Факторы риска неинфекционных заболеваний – это условия и/или особенности образа жизни, которые, не являясь непосредственной причиной заболеваний, могут способствовать развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, бронхо-легочной патологии и сахарного диабета (факторы взаимосвязаны и усиливают действие друг друга).

Центр медицинской профилактики
КОГБУЗ «МИАЦ»
С использованием материалов ФГБУ
ГНИЦПМ Минздрава России, Москва
www.gnicpm.ru

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ

ВОЗРАСТ

КУРЕНИЕ

В среднем курящий человек сокращает себе жизнь на 10-15 лет.

- ✓ **Откажитесь от курения!** Избегайте мест и ситуаций, в которых Вы подвергаетесь воздействию окружающего табачного дыма!



ПОЛ

(у мужчины инфаркт миокарда и мозговой инсульт развиваются в среднем на 10 лет раньше)

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ФАКТОРЫ, НА КОТОРЫЕ МЫ МОЖЕМ ПОВЛИЯТЬ

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНΙΑ

Повышенное артериальное давление (АД) – ведущий фактор риска, определяющий высокую смертность населения в развитых странах.


- ✓ **Уровень АД 140/90 мм рт. ст. и выше считается повышенным, не превышайте эти цифры!** Сократите употребление соли, не допускайте ожирения, откажитесь от курения и злоупотребления алкоголем!



НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Связано в одну цепочку с избыточной массой тела, повышенным артериальным давлением, повышенным холестерином и сахаром крови.

- ✓ **Соблюдайте режим питания** (3 основных приема пищи и 2 перекуса), **следите за разнообразием пищевых продуктов, соответствием энергопоступления и энергозатрат!**



НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у малоподвижных людей в два раза выше по сравнению с физически активными.

- ✓ **Небольшая физическая активность лучше, чем ее отсутствие. Умеренная физическая активность – не менее 30 минут ежедневно!**



ИЗБЫТОЧНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ

Безопасных границ ежедневного употребления алкоголя не существует, т.к. даже малые дозы могут спровоцировать отклонения в состоянии здоровья.


- ✓ **Старайтесь не злоупотреблять алкоголем!**



ПОВЫШЕННЫЙ ХОЛЕСТЕРИН КРОВИ

Снижение риска смерти от ишемической болезни сердца прямо пропорционально снижению холестерина.

- ✓ **Контролируйте уровень общего холестерина, норма – не более 5,0 ммоль/л. Ограничьте употребление животных жиров в пользу растительных, регулярно употребляйте рыбу, сократите употребление соли, увеличьте количество фруктов и овощей в рационе!**



ПОВЫШЕННЫЙ САХАР КРОВИ

сопровождается нарушением всех видов обмена, особенно углеводного.

- ✓ **Контролируйте уровень глюкозы, норма – не более 6,1 ммоль/л (из вены). Избегайте ожирения, ограничьте употребление продуктов, содержащих сахар и муку высшего сорта, будьте физически активны!**



СТРЕСС

и тревожно-депрессивные состояния более чем в два раза увеличивают риск развития инфаркта и инсульта.

- ✓ **Зачастую источником стресса является не событие, как таковое, а наша реакция на это событие – измените отношение к ситуации! Ключ к мужскому спокойствию – здоровый образ жизни и своевременное избавление от напряжения!**



ОЖИРЕНИЕ

увеличивает риск заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сахарного диабета, онкопатологии, способствует снижению потенции и ухудшению репродуктивного здоровья мужчины. Объем талии у мужчин **не должен превышать 94 см**, соотношение объема талии и бедер – **не более 1**.

- ✓ **Сократите употребление животных жиров и простых углеводов, уменьшите размер привычной порции, откажитесь от фаст-фуда! Увеличьте физическую активность! Контролируйте массу тела раз в неделю!**



Для консультации и получения медицинской помощи обращайтесь в кабинеты медицинской профилактики по месту жительства, в Центры здоровья г.Кирова и области